


21.57x20.12	1	23 עמוד	הארץ - כותרת	19/04/2013	36623069-5
כנס קרדיולוגיה פולשני - 136344					

סקר האיגוד הקרדיולוגי: אם עוברים אירוע לב, עדיף שזה יקרה מחוץ לבית

דן אבן

רכו לאלו בצפון ובדרום. לאורך העשור האחרון גדל היקף החולים עם התקפי לב המיטופלים בצנתורים מ-58% בשנת 2000 ל-90% ב-2010, ולצד מגמה זו ניכרת ירידה בשיעור המטופלים באמצעות ניתוח לב (ניתוח מעקפים) מ-8.7% ל-1.7%. הנתונים מהסקר האחרון מצביעים על ירידה מעורדת בתמותה מהתקפי לב: התמותה כעבור שבוע מהתקף הלב ירדה לאורך עשור בלמעלה ב-50% מ-5.2% תמותה ל-2.1%. התמותה כעבור חודש מהתקף הלב ירדה אף היא מ-8.5% ל-4.2% מהחולים.

סקר הקרדיולוגים הבא, שאיסוף הנתונים עבורו החל בתחילת החודש (אפריל 2013), מבוצע לראשונה בשיתוף פעולה עם מד"א, ויבחן לראשונה בישראל את הטיפול שניתן לחולים עם התקפי לב בשטח ובטרם בואם לחדר מיון. במסגרת הסקר תבוצע בדיקה ראשונה לאנשים שמתו מדום לב בטרם בואם לבית החולים. לדברי מטצקי, "מסקנות הסקר יוכלו להשפיע על אופן הקצאת משאבים, למשל בהיכנסת מכשירי דפיברילטורים להחייאות במקומות ציבוריים ולחינוך הציבור כיצד לפעול במקרה של אירוע לב חמור כדי להפחית את הסיכון לתמותה ולנזקים". בשבוע הבא ייערך כנס האיגוד הקרדיולוגי בבנייני האומה בירושלים במלאת 60 שנות פעילות לאיגוד.



בין הופעות התסמינים לקבלת הטיפול הרפואי עוברות 195 דקות בממוצע - שלוש שעות ורבע

נת אמבולנס, בשל החשש מחיוב כספי אם יתברר כי מדובר היה בהזעקת שווא. ניתוח נוסף שבוצע בחודש שים האחרונים מגלה כי למרות ההבדלים בשיעורי המיטות והרופאים בין המרכז לפרפריה בישראל, ואף על פי שממצאי הסקר הקודם שבוצע ב-2008 הצביעו על הבדלים בטיפול בין אזורים הארץ - הברלים אלה נעלמו, ואין שוני בטיפול ובשיעורי התמותה של חולים לאחר התקפי לב בין בתי החולים במי

התסמינים לקבלת הטיפול עוברות 195 דקות בממוצע - שלוש שעות ורבע. יצוין כי בסקר אובי-חנה שונות בין בתי החולים, ונצפו המתנות של בין 40 ל-110 דקות. רק 64% מהחולים טופלו תוך 90 דקות מבואם לבית החולים. רק 56% מהחולים עם התקפי לב בסקר פונו לבית החולים בניידת טיפול נמרץ (נט"ז), 9% פונו באמבולנס רגיל והיתר - 35% בכוחות עצמם או על ידי קרוביהם. הסקר מצא בנוסף כי רבים מעדיפים לוותר על הזמ

בהשוואה ל-72 דקות בשאר שעות היממה. כמו כן, נמצא כי חולי סוכרת פונים לטיפול רפואי 90 דקות לאחר תחילת הסימנים להתקף לב, בהשוואה ל-60 דקות בקרב אלו שאינם חולים. "חולי סוכרת סובלים מסימנים מתונים יותר להתקף לב", אומר מטצקי, "ופחות חווים כאבים בחזה, אם בכלל, ולכן מתעכבים בפנייה לטיפול".

סקר הלב המכונה ACSIS בו-צע בעשור החולף אחת לשנתיים, ולאחרונה אחת לשלוש שנים. הסקר הנוכחי, שנעשה בחודשים אפריל-מאי 2010 ב-26 המחוזות הקרדיולוגיות בכל בתי החולים הכלליים בארץ, הקיף 1,981 חולים שעברו התקפי לב. הממצאים החרשים הוצגו באחרונה בפני המועצה הלאומית לקרדיולוגיה המייעצת להנהלת משרד הבריאות.

הסקר הראה כי העיכוב החמור ביותר בטיפול הרפואי מקורו בזמן החולף מרגע הופעת הסימנים להתקף לב ועד להזעקת עזרה - העומד על נתון חציוני של 85 דקות, מעל לשעה עיי-כוב. כמו כן חולפות 42 דקות מהזעקת העזרה ועד בוא החולה לבית החולים (בנשים משך הזמן עד הפינוי לבית החולים ארוך כ-10 דקות בהשוואה לגברים). בהמשך מתוערת המתנה של 68 דקות עד קבלת טיפול, הנמוכה מהמדד המקובל במערב של 90 דקות. בסך הכל בין הופעות

ממצאים חרשים מהסקר התיקופתי של האיגוד הקרדיולוגי חושפים כי כמחצית מהישראלים שעברו התקף לב מועדים לעיי-כוב במתן טיפול רפואי ולתמונה מוגברת. יתר על כן, הנתונים מראים כי העיכוב גדל עוד יותר בקרב אלו העוברים את האירוע הלבני בביתם.

הסקר - המצביע על גורמי הסיכון המעכבים את הטיפול הרפואי בישראלים העוברים התקפי לב - מצא כי הזמן החולף מאז תחילת הסימפטומים - כאבים עזים בחזה - ועד להזעקת טיפול רפואי עומד על 90 דקות בקרב אלו העוברים את אירוע הלב בביתם בהשוואה ל-36 דקות בלבד בקרב נפגעי אירוע לבבי במקום ציבורי או במקום העבודה. לדברי הפרופ' שלומי מטצקי מהמרכז הרפואי שיבא, המשמש יו"ר החוג לטיפול נמרץ לב באיגוד הקרדיולוגי ומר"כ את הסקר, "במקומות ציבוריים יש חברים לעבודה או אנשים הנימצאים במקום האירוע שמוזמנים ניידת טיפול נמרץ ומזרזים את הפינוי לבית החולים".

בדיקה נוספת הראתה כי אלו שמפתחים סימנים להתקף לב בלילות נמצאים אף הם בסיכון מוגבר לעיכוב בפנייה לטיפול רפואי. נמצא כי הזמן שחולף מהופעת הסימנים ועד להזעקת טיפול עומד על 120 דקות בשעות הלילה, מחצות עד 8 בבוקר,