



## עצות לשימוש באמידארון (Amiodarone)

אמידארון הינה תרופה אשר משמשת לויסות הפרעות בקצב הלב. זוהי התרופה היעילה ביותר לטיפול בהפרעות בקצב הלב, אך היא עלולה, במיעוט המטופלים, לגרום לתופעות לוואי הדורשות מעקב רפואי. אמידארון משמשת לשמירה על קצב לב תקין (קצב סינוס). כמו כן, התרופה מסייעת בהשבת קצב הלב לקדמותו.

### תופעות לוואי

למרות השימוש בתרופה על פי רוב אינו גורם לתגובות בלתי רצויות, קיימות מספר תופעות לוואי אשר משפיעות בדרכים שונות על איברי הגוף השונים שלנו.

### העור

במהלך הטיפול באמידוראן, העור עלול לשנות את צבעו לגוון כחול-אפרפר. תופעה זו תיפסק לאחר הפסקת השימוש באמידורון, אך העלמותה המוחלטת עלולה לארוך זמן רב.

בזמן שימושך באמידארון, ייתכן ותהיה רגיש יותר לכוויות שמש. שימוש, בקרם מגן שיזוף עם -מקדם הגנה גבוה וחבישת כובע עשוי למנוע תופעת לוואי זו. משום שאמידארון נשאר בגוף למשך זמן ממושך, ייתכן ויידרש להמשיך בשימוש בקרם מגן שיזוף למשך מספר חודשים לאחר הפסקת הטיפול.

### העיניים

עלולים להווצר משקעים זעירים בקרנית העין (המשטח השקוף המכסה את האישון, את הקשתית ואת השטח הלבן בעין). משקעים אלה אינם מזיקים לגוף ועצם הופעת אינו התוויה להפסקת הטיפול. עם זאת, ייתכן שתבחין בהשפעתם של משקעים אלו כאשר תחשף לאור בהיר בשעות הלילה, למשל, במהלך נהיגה ברכב. מבין האנשים הנוטלים את התרופה, אחד מכל עשרה עלול להבחין בהילה כחלחלה. יצוין שוב כי תופעה זו אינה מסוכנת. ההתוויה להפסקת התרופה כאשר המשקעים גורמים לפגיעה בחדות הראייה. באופן נדיר עלולה להיות פגיעה עינית חמורה. לכן יש לפנות לרופא אם יש סמפטומים של הפרעות או קשיי ראייה.

## הריאות

אמיודארון עלול לגרום לבעיות הנובעות מהתעבות (פיברוזיס) של כמה ממרכיבי הריאות. אם הינך חש בקשיי נשימה, עלייך לפנות אל רופא המשפחה שלך בהקדם האפשרי.

## הכבד

אמיודארון עלול במקרים נדירים לגרום לבעיות בתפקודי הכבד, אשר ניתנות למיגור ע"י הפחתת מינון התרופה. רופא המשפחה שלך יוכל לוודא כי לא קיימות השפעות שליליות על הכבד באמצעות בדיקות דם שגרתיות. לרוב עלייה של עד פי שלוש מהערכים הנורמליים אינה משמשת התווייה להפסקת התרופה.

## אינטראקציה- תגובה עם תרופות אחרות

השימוש בתרופה עלול לגרום לאינטראקציה עם תרופות אחרות אותן אתה נוטל, הרבות השפעה על רמות ה-INR שלך, אם הינך נוטל וורפארין. ככלל עלייה במינון הפרוקור גורמת להשפעה כאילו הועלה מינון הקומאדין וירידה במינון כאילו הורד מינון זה. לכן שינויי במינון הפרוקור מצדיק עלייה בתדירות בדיקות ה-INR.

## מעקב רפואי

אמיודארון הינה תרופה שימושית ביותר, ושמושה לטובתך בלבד. למרות שתופעות הלוואי המצוינות לעיל הן נדירות, חשוב לבצע מעקב רפואי סדיר במהלך השימוש בתרופה. עלייך להבדק מדי חצי שנה ע"י רופא המשפחה שלך במהלך השימוש באמיודארון ויהיה עלייך לבצע בדיקות דם על מנת לוודא כי תפקודי בלוטת התריס והכבד שלך תקינים, כמו גם בדיקת רופא עיניים.

חוברת מידע זו תורגמה והותאמה לשימוש בישראל ע"י החוג לאלקטרופיזיולוגיה וקיצוב של האיגוד הישראלי לקרדיולוגיה. חלק קטן מן התכנים וההמלצות אינם רלבנטיים לישראל. המידע בחוברת ניתן לצורך חינוך ומתן מידע כללי ואינו תחליף ליעוץ מקיף ומסודר ע"י הקרדיולוג המטפל.