



דרונדרון - מולטאק – לטיפול תרופתי בפרפור פרוזדורים

אודות מולטאק

מולטאק היא תרופה אנטי-ארייתמית הדומה במבנה ומנגנון הפעילות לפרוקור. ההבדל העיקרי הינו העדר מולקולות יוד במבנה הכימי של התרופה. לכך נודעת חשיבות בהפחתת תופעות הלוואי ובמיוחד אלו על בלוטת התריס. יתרונותיה של מולטאק הם בכך שאינה מכילה יוד, כך שתופעות הלוואי על בלוטת התריס אינן קיימות (רק באופן נדיר ביותר) והיא אינה מסיסת שומן כך שגם פגיעה באברים כגון כבד וראות היא נדירה ביותר.

מולטאק פועלת על מספר רב של תעלות יונים עם מאפיינים המתאימים לכל קבוצות Waghams ו Williams ומסווגת בעיקר כקבוצה III בשל פעילות העיקרית על חסימת תעלות האשלגן בדומה לפרוקור. מולטאק הוכנסה לאחרונה לשימוש בישראל והיא מאושרת לשימוש בחולים עם הפרעות קצב.

יעילות מולטאק

מולטאק הראתה יעילות בהפחתת הסיכון לאשפוזים מסיבה לבבית או תמותה לבבית בחולים עם פרפור פרוזדורים. בנוסף לכך, מולטאק מונעת השנות פרפור פרוזדורים, מביאה לשיפור התסמינים ולהאטת קצב הלב. בישראל, היא מאושרת לשימוש בקופות החולים על פי סל הבריאות לחולים אשר אינם יכולים לקבל אמיודארון או אינם מגיבים לאמיודארון

יש לציין כי בחולים עם א"ס לב מתקדמת ומשמעותית (דרגה III ו IV) יש עדויות לעלייה בסיכון ולכן בשלב זה אינה מאושרת לשימוש באוכלוסיית חולים זו.

מולטאק :

- ניתנת במינון אחיד דרך הפה, שאינו דורש התאמה או ניטור.
- 400 מ"ג ב 2 מנות ביום עם ארוחת
- אינה דורשת אשפוז לצורך תחילת טיפול או ניטור לאחר התחלת הטיפול.
- דורשת בדיקת דם כשבוע לאחר תחילת טיפול לקביעת קמת בסיס של קיראטינין

תופעות הלוואי העיקריות שתוארו הן תופעות של כאבי בטן או בחילות. ייתכן דופק איטי.